

# Anleitung: Metall Spender Aufbereitung



## Vorgehensweise



Laut des Robert Koch-Instituts (Richtlinie „Händehygiene“) kann eine unzureichende Spenderhygiene insbesondere bei Einsatz von Wäschlotionen zu Keimbesiedlungen von Spendersonsystem und Produkt führen. Der Umfang und die Häufigkeit der Reinigung und Desinfektion des Dosierspendergehäuses und der Dosierpumpe muss in hauseigenen Hygieneplänen festgelegt werden. Wir empfehlen Ihnen folgende Aufbereitungsintervalle:

**Bei dem Einsatz von Händedesinfektionsmittel:**


- Vollständige Spenderaufbereitung zweimal pro Jahr (halbjährlich).

**Bei dem Einsatz von Wäschlotionen:**

- Vollständige Spenderaufbereitung bei jedem Flaschenwechsel.

**ACHTUNG:**  
Bei der Spenderaufbereitung gilt „Personalschutz mit potenziell kontaminiertem Material“. Daher für die Spenderaufbereitung unbedingt Handschuhe tragen.

## Desinfektion der Pumpe




Schritt 1: Pumpe wieder in den Spender einbauen und eine Flasche mit alkoholischem Schnell-Desinfektionsmittel (DESCOSEPT PUR) einsetzen.

## Reinigung



Die Pumpe mit einer Bürste unter fließendem Wasser gründlich reinigen. Bei schwierigen Verschmutzungen Reinigungsbürste verwenden. Dabei im Besonderen auf den Pumpenauslauf und die Gewinde achten. Grüne Kappe entfernen und separat reinigen. Anschließend Pumpe mit heißem Wasser über dem Waschbecken folgendemaßen durchspülen.


## Reinigung




Schritt 1: Ein Gefäß mit heißem Wasser unter den Ansaugstutzen der Pumpe halten und 10 x pumpen. (Pumpe von Touchlessspender hat keine eigene Federkraft und muss von Hand angehoben werden)

Schritt 2: Anschließend ohne Wassergefäß Pumpe leer pumpen.


Schritt 1 und 2 wiederholen.




Ein neues Produktgebinde in den Spender einhängen und das neue Produkt mehrmals (15 – 20 x) in den Auffangbehälter pumpen. Die im Auffangbehälter aufgefangenen Reste können über das Abwassersystem entsorgt werden.



Schritt 2: Nach vollendetem Einwirkzeit Desinfektionslösung entfernen und die Pumpe leer pumpen. Die Reste in einem Auffangbehälter auffangen. Pumpe mit einem füsselfreien Einmaltuch abwischen.



Anschließend die Pumpe 15 – 20 x betätigen und Reste in einem Auffangbehälter mit kaltem Wasser auffangen. Auf die produkt-spezifischen Einwirkzeiten ist zu achten.



Schritt 1: Nach vollendetem Einwirkzeit Desinfektionslösung entfernen und die Pumpe leer pumpen. Die Reste in einem Auffangbehälter auffangen. Pumpe mit einem füsselfreien Einmaltuch abwischen.